LEPIDOPTEROS ARGENTINOS CON DESCRIPCION DE ESPECIES NUEVAS (*LEP. HET.*)

por

P. KÖHLER

THYRIDIDAE

Risama falcata matusi ssp. nov.

Color general amarillento-rosado; la puntuación falta casi completamente. La mácula discal y la introcelular bien aisladas y bien destacadas. Todos los demás diseños nítidamente dibujados con un color plomizo pálido.

La subespecie nueva está especialmente bien caracterizada por la presencia de todos los dibujos en ambas faces de las alas, destacándose en la faz inferior tan nítidamente como en la superior.

Exp. al.: 38-43 mm.

Habitat: Posadas. III. 1940.

Cotipos: en la colección del autor.

Dedico esta bella subespecie a su descubridor, Ing. Agr. Máximo D. Matus, quien ha cazado varios ejemplares a la luz.

Draconia exesa spec. nov.

Palpos, cabeza, tórax y abdomen de un color pardo algo grisáceo; patas y la faz inferior algo más blancuzcas. Alas anteriores con una fuerte dilatación basal del margen anterior; las escotaduras como en *D. peripheta*. La distribución de las manchas semitransparentes se destaca bien y están distribuídas como en la *D. rusina*, pero son de mayor amplitud. Las escotaduras de las alas anteriores como en *D. rusina*, *pero con el tornus entero.*

Exp. al.: 75 mm.
Habitat: Puerto Bemberg (Hayward).
Alotipo: en col. Breyer.

AGARISTIDAE

Alypia lulesa spec. nov.

1 ♂, 1 ♀; De pardo negruzco con suave brillo aterciopelado; las nervaduras se destacan en ambas superficies de las alas: en la faz superior son mates por completo y con un matiz de azul muy obscuro, en la inferior más pálidas que el campo general.

Una faja oblicua recta, de color amarillo pálido, mate, sobre la discocelular al torno, tocando casi a éste y al margen anterior; el ancho de esta faja es ¼ de su largo.

Exp. al.: 31 mm.
Habitat: Quebrada de Lules, Tucumán (Schreiter leg. 21.I.1920).
Holotipo en el Instituto Lillo.
Alotipo en la colección del autor.

Al efectuar la clasificación de los *Agaristidae* del Instituto Lillo de Tucumán aproveché el material de la colección Breyer que he estudiado y clasificado hace algunos años y en ella me encontré con un ejemplar nuevo, que es nuevo para nuestro país:

Orthia augias nexa Boisd.

Spéc. Gèn. Lép. Ht. I: 543.

Conocida hasta ahora de Colombia, Bolivia, Perú y del Amazonas.
1 ♀ ex Loreto, Misiones (Ogloblin leg.) en la colección Breyer.